

Nieuwe richtlijnen Influenza A/H1N1 (Mexicaanse griep): Schema (v1-20090715)

Mogelijk geval:

- ✓ koorts (> 38°C)
- ✓ EN hoesten en of dyspnee
 - kan minder uitgesproken zijn bij kinderen; loopneus
 - evt. ook keelpijn
- ✓ EN algemene malaise
 - ook spierpijn/gewrichtspijn, hoofdpijn, rillingen, overgeven/diarree

Wat te doen als een patiënt zich op spoed meldt:

- ✓ Na een korte anamnese en als het klinisch beeld het toelaat: patiënt doorverwijzen naar de huisarts.
 - ✓ Uitzondering: steeds consult door specifieke discipline (cfr. afspraak met medisch diensthoofd):
 - zwangeren, enkel zo ernstig ziek
 - kinderen
 - geriatrische patiënten
 - dialysepatiënten
 - chemopatiënten
- ✓ Wanneer het klinisch beeld het niet toelaat: patiënt opnemen in box 6 of box 5

Risicogroepen:

- ✓ patiënten met een chronische ademhalingsziekte
- ✓ patiënten met chronische hartaandoening
- ✓ patiënten met matige ernstige nier- of leverinsufficiëntie
- ✓ patiënten met immunodepressie wegens ziekte of een behandeling
- ✓ diabetespatiënten
- ✓ zwangere vrouwen
- ✓ personen die ouder zijn dan 65 jaar
- ✓ kinderen jonger dan 5 jaar

Mogelijke Opnamecriteria:

- ✓ bij volwassenen:
 - verminderde waakzaamheid, desoriëntatie, verwardheid
 - systolische bloeddruk < 90 mmHg
 - lichaamstemperatuur minder dan 35°C of vanaf 40°C
 - ademhalingsfrequentie meer dan 30 per minuut, respiratoire distress
 - hartfrequentie meer dan 120 per minuut
- ✓ bij kinderen: één van de volgende tekenen:
 - voedingsproblemen (minder dan de helft van de voorziene flessen over 12 uur) bij een zuigeling jonger dan 6 maand
 - hardnekkig aanhoudende koorts, ondanks koortsverlagende maatregelen
 - acute dehydratatie
 - daling bewustzijn
 - repetitieve convulsies
 - respiratoire distress, apneu
 - kinderen jonger dan 3 maand, antecedenten van prematuriteit

Stappen te ondernemen:

- ✓ Bescherm jezelf volgens de standaardvoorzorgsmaatregelen en bijkomende aërogene en contact maatregelen (druppel is hierin begrepen) (schort, handschoenen, eendenbekmasker, bril): deze zijn terug te vinden onder ziekenhuishygiëne/procedures/ isolatiemaatregelen
- ✓ Deur gesloten houden
- ✓ Patiënt een (chirurgisch) masker opzetten
- ✓ Mobiele hepafilter installeren (5 karren beschikbaar)
- ✓ Neem een nasofaryngaal staal (zo vragen neem contact met labo tel 5460): voorlopig nog rood UTM-medium met bijhorende flexibele wisser
- ✓ Geef familie informatiefoldertje mee

Opname naar de afdelingen:

- ✓ Beademde patiënten naar intensieve zorgen in de isolatieboxen
- ✓ Andere patiënten naar de isolatiekamers op de afdelingen (elke dienst heeft er 1). Waarschijnlijk zullen deze nog moeten vrij gemaakt worden.
- ✓ Kindjes op pediatrie
- ✓ Zwangeren naar 3 toegewezen observatiekamers op materniteit (bevalingen in de sectiozaal)
- ✓ (Routine dialyse zal gebeuren in de aanwezige isolatieboxen)

Behandeling:

- ✓ Bij risicogroepen start Tamiflu® op (2 maal daags 1 dosis van 75mg) gedurende 5 dagen. (kinderen: zie bijgaand schema RIVM)
- ✓ Bij zwangere vrouwen in het tweede en derde trimester wordt Relenza® aanbevolen (2 maal daags 2 inhalaties). Tijdens het eerste trimester kan Tamiflu® worden overwogen.
- ✓ Geef geen medicatie met ambulante patiënten mee deze moeten hiervoor naar de huisarts.


Geen melding meer van elk individueel geval aan gezondheidsinspectie!

Eventuele vragen via:

Dr. J. Frans, ziekenhuiscoördinator influenza (5465) of
Dr. A. Smismans, geneesheer ziekenhuishygiënist (5466)
Zo nodig: Dr. K. De Schrijver, gezondheidsinspecteur Antwerpen (03/2246204) of gezondheidsinspecteur van wacht bij dringende zaken (02/5129389)






Zie ook: <http://frontpage.imz.be/zh/index.htm>

Overleg influenza: Dr. J. Frans, Dr. A. Smismans, Dr. M. Gillis, Dr. E. Frans, Dr. JP Van Boxelaer, M. Gevels, R. De Cock, N. Reynders, C. Beullens, A. Verbraeken, H. Jannes



Informatie over gebruik Tamiflu bij volwassenen, kinderen en zwangeren

Start de **behandeling** met Tamiflu zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 dagen nadat de eerste griepverschijnselen zich hebben voorgedaan:

Gewicht	Leeftijd	Behandeling influenza
Volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder		Neem één capsule van 75mg iedere 12 uur gedurende 5 dagen 
40 kg of meer	10-12 jaar	
23 kg – 40 kg	6-9 jaar	2 capsules 30 mg iedere 12 uur, gedurende 5 dagen 
15 kg - 23 kg	3-5 jaar	1 capsule 45 mg iedere 12 uur, gedurende 5 dagen 
< 15 kg	1-2 jaar	1 capsule 30 mg iedere 12 uur, gedurende 5 dagen 
Alléén tijdens een door de WHO verklaarde pandemie in de context van een nieuwe influenza A (H1N1) uitbraak Kinderen tot 1 jaar*		enkel onder medisch toezicht: 2 tot 3 mg per kg lichaamsgewicht iedere 12 uur, gedurende 5 dagen

* (advies CHMP 7 mei 2009)

Zie ook bijsluiter Tamiflu (via www.roche.nl) voor aanpassing nierinsufficiëntie en toediening in afwezigheid van suspensie zo nodig: http://www.roche.nl/portal/synergy/static/file/synergy/alfproxy/download/1414-a54fc545414911de9ab93b45229b4a9e/last/tamiflu_75mg_vii65_11052009_s.pdf

Zie ook bijsluiter Relenza: (via <http://www.relenza.com/hcp/index.html>):
http://us.gsk.com/products/assets/us_relenza.pdf

