



Apotheek Imeldaziekenhuis Bonheiden
Vragen? 015/50 62 03 of 015/50 62 00

Uw arts schrijft **antibiotica** voor die u thuis zal moeten innemen.

Ga indien nodig langs bij uw huisarts en uw huisapotheker. Neem steeds uw ontslagbrief en medicatieschema mee. Voorschriften kunnen door de zorgverlener opgezocht worden via uw identiteitskaart.



Waarom moet ik antibiotica innemen?

Om infecties met bacteriën te bestrijden door ze te doden of hun groei te remmen. Antibiotica werken niet tegen virussen of schimmels en niet voor elke infectie zijn antibiotica nodig. Bij griep of een verkoudheid heeft het bijvoorbeeld geen nut antibiotica in te nemen. Antibiotica werken ook niet preventief. Neem ze dus enkel op advies van de arts.

Neem de antibiotica in via de **mond**. Het is een geneesmiddel in de vorm van een capsule, pil, siroop...

De frequentie, timing en duur van de behandeling bepalen het succes van de antibioticakuur. **Volg de aanwijzingen van uw arts of apotheker nauwkeuring**. Verander ook nooit de dosis op eigen initiatief. Neem het antibioticum steeds in op het voorgeschreven tijdstip.



Moet ik de hele doos antibiotica uitnemen?

Neem de antibiotica net zolang in als voorgeschreven, niet langer en niet korter. Soms kan dit betekenen dat je niet de hele doos moet uitnemen. Kijk op de ontslagbrief of het medicatieschema of vraag dit na bij uw arts of apotheker. Soms hangt dit ook af van hoe de ziekte verloopt en wordt dit op een tussentijdse controle verder bepaald. Stop nooit zomaar wanneer je je beter voelt, want dat kan bijdragen tot de ontwikkeling van resistentie. Dit wil zeggen dat antibiotica de infectie veel moeilijker of gewoon niet meer zullen genezen omdat bacteriën ongevoelig worden voor de medicatie.



Wat doe ik met de overschot van de antibiotica?

Breng ze naar je apotheker. Gooi antibiotica nooit in de gootsteen, het toilet of de vuilnisbak. Anders komen ze in onze natuurlijke omgeving terecht en dat draagt bij tot de ontwikkeling van resistentie. Neem restjes nooit in op eigen initiatief, omdat de kans groot is dat het niet de juiste medicatie is. Dat kan een goede diagnose vertragen en je probleem verergeren.



Wat indien ik mijn antibioticum niet op tijd ingenomen heb?

Neem het antibioticum zo snel mogelijk alsnog in. Maar doe dit niet als het bijna tijd is voor de volgende inname. Neem de volgende dosering dan in op de normale tijd.



Apotheek Imeldaziekenhuis Bonheiden
Vragen? 015/50 62 03 of 015/50 62 00

Levofloxacin, moxifloxacin, ciprofloxacin of ofloxacin

- Chinolonen doden bacteriën (**antibiotica**) en worden gegeven bij behandeling van infecties van de urinewegen, geslachtsorganen, darmen en luchtwegen.
- Om ontwikkeling van resistentie (bacteriën die ongevoelig worden voor deze medicatie) en ernstige ongewenste effecten te beperken, zijn deze antibiotica enkel terugbetaald bij specifieke infecties of omstandigheden. Neem dit geneesmiddel dus enkel op advies van uw arts en voor de periode voorgeschreven door uw arts.
- Deze antibiotica zijn enkel verkrijgbaar in de apotheek met een **voorschrift**.

Inname

- Volg strikt het voorschrift van de arts en neem de voorgeschreven hoeveelheid per keer en het aantal voorgeschreven innames per dag in.
- Neem uw geneesmiddel in met water en **niet met melk(producten)**.
- Het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen tegen maagbranden (zuurremmers) die aluminium, calcium, magnesium bevatten of andere geneesmiddelen die deze stoffen of ijzer bevatten, wordt afgeraden. Als u deze geneesmiddelen toch moet innemen, dient een zo lang mogelijke **termijn** te worden voorzien **tussen de inname** van het antibioticum en deze geneesmiddelen:
 - Neem levofloxacin, ciprofloxacin of ofloxacin dan minstens 2 uur voor of 2 uur na deze geneesmiddelen.
 - Neem moxifloxacin dan minstens 6 uur voor of 6 uur na deze geneesmiddelen.

Ongewenste effecten en voorzorgen

- Chinolonen mogen niet ingenomen worden tijdens de **zwangerschap en borstvoeding**.
- Raadpleeg uw arts indien u last krijgt aan uw **achillespezen** (dit kan vooral optreden bij ouderen of bij gelijktijdig gebruik van corticosteroiden) en in geval van plotselinge **buik-, borst- of rugpijn**.
- **Vermijd rechtstreekse blootstelling aan zonlicht** (draag beschermende kledij en een hoofddeksel) tijdens behandeling met chinolonen en stop de behandeling indien lichttoxiciteit (bv. huiduitslag) optreedt. Een zonnfilter of een zonnecrème met hoge beschermingsgraad dienen te worden overwogen.