



Apotheek Imeldaziekenhuis Bonheiden
Vragen? 015/50 62 03 of 015/50 62 00

Uw arts schrijft **antibiotica** voor die u thuis zal moeten innemen.

Ga indien nodig langs bij uw huisarts en uw huisapotheker. Neem steeds uw ontslagbrief en medicatieschema mee. Voorschriften kunnen door de zorgverlener opgezocht worden via uw identiteitskaart.



Waarom moet ik antibiotica innemen?

Om infecties met bacteriën te bestrijden door ze te doden of hun groei te remmen. Antibiotica werken niet tegen virussen of schimmels en niet voor elke infectie zijn antibiotica nodig. Bij griep of een verkoudheid heeft het bijvoorbeeld geen nut antibiotica in te nemen. Antibiotica werken ook niet preventief. Neem ze dus enkel op advies van de arts.

Neem de antibiotica in via de **mond**. Het is een geneesmiddel in de vorm van een capsule, pil, siroop...

De frequentie, timing en duur van de behandeling bepalen het succes van de antibioticakuur. **Volg de aanwijzingen van uw arts of apotheker nauwkeuring**. Verander ook nooit de dosis op eigen initiatief. Neem het antibioticum steeds in op het voorgeschreven tijdstip.



Moet ik de hele doos antibiotica uitnemen?

Neem de antibiotica net zolang in als voorgeschreven, niet langer en niet korter. Soms kan dit betekenen dat je niet de hele doos moet uitnemen. Kijk op de ontslagbrief of het medicatieschema of vraag dit na bij uw arts of apotheker. Soms hangt dit ook af van hoe de ziekte verloopt en wordt dit op een tussentijdse controle verder bepaald. Stop nooit zomaar wanneer je je beter voelt, want dat kan bijdragen tot de ontwikkeling van resistentie. Dit wil zeggen dat antibiotica de infectie veel moeilijker of gewoon niet meer zullen genezen omdat bacteriën ongevoelig worden voor de medicatie.



Wat doe ik met de overschot van de antibiotica?

Breng ze naar je apotheker. Gooi antibiotica nooit in de gootsteen, het toilet of de vuilnisbak. Anders komen ze in onze natuurlijke omgeving terecht en dat draagt bij tot de ontwikkeling van resistentie. Neem restjes nooit in op eigen initiatief, omdat de kans groot is dat het niet de juiste medicatie is. Dat kan een goede diagnose vertragen en je probleem verergeren.



Wat indien ik mijn antibioticum niet op tijd ingenomen heb?

Neem het antibioticum zo snel mogelijk alsnog in. Maar doe dit niet als het bijna tijd is voor de volgende inname. Neem de volgende dosering dan in op de normale tijd.



Apotheek Imeldaziekenhuis Bonheiden
Vragen? 015/50 62 03 of 015/50 62 00

Linezolid

- Linezolid remt de groei van bacteriën (**antibioticum**).
- Om ontwikkeling van resistentie (bacteriën die ongevoelig worden voor deze medicatie) te beperken, wordt dit antibioticum enkel gebruikt bij ernstige infecties resistent tegen de gebruikelijke antibiotica of bij ernstige ongewenste effecten bij gebruik van de gebruikelijke antibiotica. Neem dit geneesmiddel dus enkel op advies van uw arts en voor de periode voorgeschreven door uw arts. De arts kan dit voorschrijven voor bv. infecties van de huid en botten en kan bij specifieke infecties of omstandigheden een attest aanmaken voor terugbetaling.
- Linezolid is **enkel via de ziekenhuisapothek** te verkrijgen met een **voorschrift**.

Geneesmiddeleninteracties

- Bepaalde geneesmiddelen, voedingssupplementen of voeding kunnen de werking van linezolid verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Vermeld steeds alle medicatie, voedings- en kruidensupplementen die u inneemt aan uw arts en apotheker.
- Tijdens de behandeling met linezolid worden **tyramine-bevattende voeding, cafeïne en alcohol best vermeden** omwille van het risico op een sterk stijgende bloeddruk. Tyramine komt van nature vooral voor in eiwitrijke producten die gemakkelijk kunnen bederven, zoals melkproducten, kaas, vlees (lever), vis (haring), eieren, gistproducten en gefermenteerde sojaproducten.

Inname

- Volg **strikt** het voorschrift van de arts en neem de voorgeschreven hoeveelheid per keer en het aantal voorgeschreven innames per dag in.
- De inname is standaard tweemaal per dag met 12 uur tussentijd (steeds op dezelfde tijdstippen). Neem het geneesmiddel in met water.

Ongewenste effecten en voorzorgen

- Linezolid kan soms maaglast, hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid of huiduitslag veroorzaken. Contacteer uw zorgverlener wanneer u problemen ondervindt of wanneer uw klachten lang blijven duren.
- Tijdens de behandeling met dit geneesmiddel is het aanbevolen om regelmatig een **bloedonderzoek** uit te voeren. Uw arts zal u hierover informeren.