



Apotheek Imeldaziekenhuis Bonheiden
Vragen? 015/50 62 03 of 015/50 62 00

Uw arts schrijft **antibiotica** voor die u thuis zal moeten innemen.

Ga indien nodig langs bij uw huisarts en uw huisapotheker. Neem steeds uw ontslagbrief en medicatieschema mee. Voorschriften kunnen door de zorgverlener opgezocht worden via uw identiteitskaart.



Waarom moet ik antibiotica innemen?

Om infecties met bacteriën te bestrijden door ze te doden of hun groei te remmen. Antibiotica werken niet tegen virussen of schimmels en niet voor elke infectie zijn antibiotica nodig. Bij griep of een verkoudheid heeft het bijvoorbeeld geen nut antibiotica in te nemen. Antibiotica werken ook niet preventief. Neem ze dus enkel op advies van de arts.

Neem de antibiotica in via de **mond**. Het is een geneesmiddel in de vorm van een capsule, pil, siroop...

De frequentie, timing en duur van de behandeling bepalen het succes van de antibioticakuur. **Volg de aanwijzingen van uw arts of apotheker nauwkeuring**. Verander ook nooit de dosis op eigen initiatief. Neem het antibioticum steeds in op het voorgeschreven tijdstip.



Moet ik de hele doos antibiotica uitnemen?

Neem de antibiotica net zolang in als voorgeschreven, niet langer en niet korter. Soms kan dit betekenen dat je niet de hele doos moet uitnemen. Kijk op de ontslagbrief of het medicatieschema of vraag dit na bij uw arts of apotheker. Soms hangt dit ook af van hoe de ziekte verloopt en wordt dit op een tussentijdse controle verder bepaald. Stop nooit zomaar wanneer je je beter voelt, want dat kan bijdragen tot de ontwikkeling van resistentie. Dit wil zeggen dat antibiotica de infectie veel moeilijker of gewoon niet meer zullen genezen omdat bacteriën ongevoelig worden voor de medicatie.



Wat doe ik met de overschot van de antibiotica?

Breng ze naar je apotheker. Gooi antibiotica nooit in de gootsteen, het toilet of de vuilnisbak. Anders komen ze in onze natuurlijke omgeving terecht en dat draagt bij tot de ontwikkeling van resistentie. Neem restjes nooit in op eigen initiatief, omdat de kans groot is dat het niet de juiste medicatie is. Dat kan een goede diagnose vertragen en je probleem verergeren.



Wat indien ik mijn antibioticum niet op tijd ingenomen heb?

Neem het antibioticum zo snel mogelijk alsnog in. Maar doe dit niet als het bijna tijd is voor de volgende inname. Neem de volgende dosering dan in op de normale tijd.



Apotheek Imeldaziekenhuis Bonheiden
Vragen? 015/50 62 03 of 015/50 62 00

Rifampicine

- Rifampicine doodt bacteriën (**antibioticum**) en kan, naast zijn gebruik bij tuberculose (in een andere dosis), uitzonderlijk gebruikt worden bij de behandeling van bepaalde ernstige infecties. Bijvoorbeeld voor de behandeling van vreemdlichaaminfecties, infectie van de hartklep, botinfecties en infecties van de tussenwervelschijf.
- Bij specifieke infecties of omstandigheden, kan uw arts een attest aanmaken voor terugbetaling. Neem dit geneesmiddel enkel op advies van uw arts.
- Het geneesmiddel is enkel verkrijgbaar in de apotheek met een **voorschrift**.

Geneesmiddeleninteracties

- Bepaalde geneesmiddelen, voedingssupplementen of voeding kunnen de werking van rifampicine verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Rifampicine kan zelf ook de werking van andere geneesmiddelen (bv. bepaalde vormen van hormonale anticonceptie) verminderen of de kans op bijwerkingen door deze geneesmiddelen verhogen.
- Vermeld steeds alle medicatie, voedings- en kruidensupplementen die u inneemt aan uw arts en apotheker.

Inname

- Volg **strikt** het voorschrift van de arts en neem de voorgeschreven hoeveelheid per keer en het aantal voorgeschreven innames per dag in.
- Rifampicine wordt altijd in combinatie met andere antibiotica genomen.
- Neem uw geneesmiddel in op een lege maag: **minstens 30 minuten voor de maaltijd of 2 uur na de maaltijd**. Neem het geneesmiddel in met water.
- In geval van maagirritatie of misselijkheid is het aanbevolen om rifampicine toch in te nemen **met een maaltijd**.

Ongewenste effecten en voorzorgen

- Rifampicine kan tijdelijke **oranje-verkleuring** van urine, zweet, speeksel, traanvocht en feces veroorzaken. Soms kan toename van vermoeidheid, misselijkheid, spierpijn, duizeligheid of rillingen voorkomen. Contacteer uw zorgverlener wanneer u problemen ondervindt of wanneer uw klachten lang blijven duren.
- Tijdens de behandeling met dit geneesmiddel is het aanbevolen om regelmatig een **bloedonderzoek en controle van de lever en nieren** uit te voeren. Uw arts zal u hierover informeren.