

Informatiebrochure

Een poortkatheter plaatsen

1. Inhoudstafel

1. Inhoudstafel	1
3. Wat is een poortkatheter?	3
4. Waar wordt een poortkatheter geplaatst?	3
5. Hoe wordt een poortkatheter gebruikt?	4
6. Nuttige telefoonnummers	6
7. Nota's	7
8. Bronnen	7


Uw behandelende arts heeft u reeds uitleg gegeven over het plaatsen van een poortkatheter. In deze brochure kunt u alle informatie rustig nalezen. Deze brochure is geen vervangmiddel voor een gesprek met uw arts en/of verpleegkundige. Mogelijks heeft u nog vragen. Schrijf ze eventueel op en aarzel niet om ze aan hen voor te leggen.

2. Wat is een poortkatheter?


Een poortkatheter is een toedieningsstelsel dat volledig onder de huid wordt ingeplant en dat voor een betrouwbare toegang tot de bloedbaan zorgt. Katheters in de arm kunnen na enkele behandelingen met chemotherapie de aders beschadigen of verzwakken. Soms wordt het dan moeilijk om in een ader te prikken en dan wordt dit systeem aanbevolen wanneer regelmatige toediening van medicatie direct in de bloedbaan noodzakelijk is.

Het poortsysteem bestaat uit de poort, een plat en rond doosje van enkele centimeters groot en is bovenaan afgesloten door een zelfsluitend siliconen membraan. In dat membraan wordt de naald geprikt waarlangs de medicijnen toegediend worden. De poort is verbonden met een dunne katheter waarlangs de geneesmiddelen in de bloedbaan worden gebracht.

3. Waar wordt een poortkatheter geplaatst?




De poortkatheter wordt meestal op de borstkas geplaatst, net onder het sleutelbeen, en is van buitenaf slechts te zien als een kleine zwelling onder uw huid. Uw arts zal de poort net onder de huid inplanten en de katheter wordt in een groot bloedvat ingebracht en opgeschoven totdat de tip zich net boven het hart bevindt.



De ingreep gebeurt in de operatiekamer, meestal onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 1 uur. U mag dezelfde dag nog naar huis. De eerste week mag u geen zware inspanningen doen. Hechtingen moeten meestal niet verwijderd worden. Als de wonde volledig genezen is, is verdere verzorging niet nodig.

4. Hoe wordt een poortkatheter gebruikt?



plaatselijke verdoving worden verwijderd.

De poort kan met een speciale naald door de huid worden aangeprikt waarna er een infuussysteem wordt aangeschakeld. Via die naald kunnen ook bloedstalen genomen worden of kan er een bloedtransfusie gegeven worden.

Zodra de behandeling beëindigd is, wordt de poortkatheter met een speciale oplossing, heparine, gespoeld om te voorkomen dat er in het systeem verstoppingen zouden ontstaan. Nadien wordt de naald verwijderd. Het poortsysteem is dan terug volledig afgesloten en u kunt al uw dagelijkse activiteiten (zoals baden, zwemmen, joggen, enz.) hervatten.

Tussen de behandelingen, gebruikt wordt, moet er gespoeld worden om Als het systeem niet meer



als de poortkatheter niet vaak toch om de zes à acht weken verstoppingen te voorkomen. gebruikt wordt, kan het onder

5. Nuttige telefoonnummers

- Het verpleegkundig team van dagziekenhuis 2 is telefonisch te bereiken elke werkdag van 7 tot 19 uur op tel. 015 50 46 30.
- Mevr. S. Van Dessel, hoofdverpleegkundige dagziekenhuis 2:
tel. 015 50 46 35
E-mail: suzanne.van.dessel@imelda.be
- Mevr. L. Van der Auweraer, hoofdverpleegkundige geneeskunde 5: tel. 015 50 47 45
- Onthaal dagziekenhuis 2:
tel. 015 50 46 60
E-mail: dzh.onthaal@imelda.be
- Receptie Imeldaziekenhuis: tel. 015 50 50 11
- Spoedgevallendienst: tel. 015 50 50 40
- Indien u dringende vragen heeft en u uw behandelende arts wenst te contacteren, kan dit eventueel via de verpleging van dagziekenhuis 2 op tel. 015 50 46 30 of via de receptie van het ziekenhuis op tel. 015 50 51 11.

Imeldaziekenhuis, Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden, www.imelda.be

6. Nota's

7. Bronnen

Procedure Imeldaziekenhuis