

Indien U diabetespatiënt bent en u een PET-onderzoek moet ondergaan, volgt u de instructies hieronder. Ongeacht het soort therapie u neemt (tabletten of injecties) moet u 4 uur voor het onderzoek nuchter zijn (= geen vast voedsel eten, geen suikerhoudende dranken drinken, geen parenterale of enterale voeding, geen glucose-infuus).

## Perorale therapie (tabletten)

- **Onderzoek heeft plaats in de voormiddag (voor 12u):**
  - U mag geen ontbijt en geen ochtenddosis innemen
  - Neem de ochtenddosis na het onderzoek, bij een verlaat ontbijt of middagmaal.
  - Let wel: indien u op 3 tabletten per dag staat, neemt u geen ochtenddosis in. Vanaf de middag volgt u uw standaardschema met middag- en avonddosis bij het middag- en avondmaal
- **Onderzoek heeft plaats in de namiddag (na 12u):**
  - Neem een ontbijt en de ochtenddosis minimum 4 uur voor het onderzoek
  - Indien u op 3 tabletten per dag staat, neemt u de dag van het onderzoek geen middagdosis in

## Injecteerbare therapie (insuline of GLP-1 analogen)

### Patiënt met subcutane insulinepomp

Vraag zo mogelijk vooraf het advies van de diabeteseducatoren (015 50 47 05).

Basaal ritme blijft ongewijzigd. Betreffende de maaltijdbolussen:

- **Onderzoek heeft plaats in de voormiddag (voor 12u):**
  - Geen insulinebolus 's morgens
  - Na het onderzoek: neem de volgende bolussen volgens schema
- **Onderzoek heeft plaats in de namiddag (na 12u):**
  - Neem de ontbijtbolus volgens schema. Na het ontbijt blijft u nuchter
  - Geen insulinebolus 's middags
  - Na het onderzoek: neem de volgende bolussen volgens schema

### Patiënt op GLP-1 analogen

Byetta® / Victoza® / Lyxumia® / Bydureon® / Trulicity® / Eperzan®

Zo injectie gepland is op de dag van het onderzoek, dient dit te worden uitgesteld tot na uitvoeren van het onderzoek.

## Patiënt op 1 injectie insuline

P2 van 2

Insuman Basal® / Insulatard® / Humuline NPH® / Levemir® / Lantus® / Toujeo® / Abasaglar®

Neem 80% van de standaard voorgeschreven dosis op het voorgeschreven standaard tijdstip (meestal de avond voor het onderzoek of eventueel de ochtend van het onderzoek)

## Patiënt op 2 injecties insuline

Novomix 30® / Novomix 50® / Novomix 70® / Humalog Mix 25® / Humalog Mix 50® / Humuline 30/70®

- **Onderzoek heeft plaats in de voormiddag (voor 12u):**
  - Neem 's morgens 50% (1/2) van de voorgeschreven dosis, en blij nuchter
  - Na het onderzoek moet u een maaltijd nemen
  - Neem 's avonds de standaard voorgeschreven dosis
- **Onderzoek heeft plaats in de namiddag (na 12u):**
  - Neem 's morgens 75% (3/4) van de voorgeschreven dosis bij het ontbijt
  - Blijf nadien nuchter tot na het onderzoek
  - Neem 's avonds de standaard voorgeschreven dosis

## Patiënt op 3 injecties insuline

Novomix 30® / Novomix 50® / Novomix 70® / Humalog Mix 25® / Humalog Mix 50® / Humuline 30/70®

- **Onderzoek heeft plaats in de voormiddag (voor 12u):**
  - Neem 's morgens 50% (1/2) van de normale dosis en blij nuchter
  - Na het onderzoek moet u een maaltijd nemen
  - Spuit 's middags en 's avonds de normale dosis in
- **Onderzoek heeft plaats in de namiddag (na 12u):**
  - Neem 's morgens 75% (3/4) van de voorgeschreven dosis bij het ontbijt
  - Blijf nadien nuchter tot na het onderzoek
  - 's Middags mag u niet inspuiten
  - Neem 's avonds de standaard voorgeschreven dosis

## Patiënt op 4 injecties insuline

Insuman Basal® / Insulatard® / Humuline NPH® / Levemir® / Lantus® / Toujeo® / Abasaglar®

Vraag indien nodig vooraf het advies van de diabeteseducatoren (015 50 47 05).

Het basale insuline dient steeds ongewijzigd te worden toegediend.

Betreffende de maaltijdinsuline (Actrapid® / Insuman Rapid® / Humuline Regular® / Novorapid® / Apidra® / Humalog® )

- **Onderzoek heeft plaats in de voormiddag (voor 12u):**
  - Geen maaltijdinsuline inspuiten 's morgens
  - Neem de 2de, 3de en 4de injectie volgens schema
- **Onderzoek heeft plaats in de namiddag (na 12u):**
  - Neem de 1ste dagdosis bij het ontbijt
  - Blijf nadien nuchter tot na het onderzoek
  - Neem de 2de dagdosis (middagmaal) na het onderzoek, enkel indien u nog een verlaat middagmaal neemt
  - Neem de 3de en 4de dosis volgens voorschrift