

## Infolder wondzorg - Furacine®

Uw wonde is verzorgd met een Furacine® kompres of zalf. Dit is aangewezen bij geïnfecteerde wonden omwille van zijn antibacteriële werking.

### **Nazorg:**

- Volgens doktersvoorschrift dient de wondverzorging 1 of 2x /dag te gebeuren.
- Mag niet langer dan 5 – 7 dagen gebruikt worden.
- Niet gebruiken op zeer grote oppervlakken en contact met ogen en slijmvliezen vermijden.

### **Algemene aandachtspunten:**

- Zorg dat het wondverband niet nat wordt.
- Neem pijnstillend medicament zo nodig.
- Wend u tot uw huisarts indien:
  - De wonde pijnlijker wordt.
  - De wonde gaat infecteren = geel/groenachtig etterig wondvocht, overvloedig gaat lekken, slecht ruikt.

Neem deze infobrochure mee naar de huisarts.

- Hou er rekening mee dat het 6 maanden en soms langer kan duren vooraleer de rode kleur van een litteken begint te vervagen. Direct zonlicht is in deze periode te vermijden.
- Meestal krijgt u een begeleidende brief met een kort verslag mee voor uw huisarts, bezorg deze brief ten gepaste tijde (bij uw eerstvolgende bezoek of deponeer de brief in de brievenbus).
- U kan bij verdere dringende vragen terecht bij de huisarts, apotheker of op onze spoedgevallendienst:  
☎ 015 50 50 40