

Infofolder wondzorg – Mepilex[®] Transfer

Uw wonde is verzorgd met een verband dat Mepilex[®] Transfer heet. Dit is een absorberend zacht siliconen verband. Het Mepilex[®] Transfer verband is aangewezen bij een brede waaier van sterk vochtafgevend wonden, wonden op moeilijk te verzorgen plaatsen en wonden met een groot oppervlak.

Voordelen:

- Kan opgelicht worden voor wondcontrole en terug geplaatst worden.
- Minimaliseert trauma en pijn bij verbandwissel.
- Minimaliseert risico op verweking.
- Vormt zich perfect naar de lichaamscontouren, als een 2de huid.
- Is comfortabel.
- Zorgt voor een vochtig wondmilieu.
- Beschermt nieuw gevormd weefsel.

Nazorg:

- Het verband niet dagelijks wisselen.
- Kan tot max. 7 dagen op de wonde blijven zolang het niet verzadigd is met wondvocht. Meestal volstaat het om enkel het secundair afdekkend verband (kompres, windel, ...) te vervangen.
- Aangezien het verband een groot absorptievermogen heeft dient men voldoende te drinken tijdens de applicatie van dit verband.

Algemene aandachtspunten:

- Zorg dat het wondverband niet nat wordt.
 - Neem pijnstillend medicament zo nodig.
 - Wend u tot uw huisarts indien:
 - De wonde pijnlijker wordt.
 - De wonde gaat infecteren = geel/groenachtig etterig wondvocht, overvloedig gaat lekken, slecht ruikt.
- Neem deze infobrochure mee naar de huisarts.
- Hou er rekening mee dat het 6 maanden en soms langer kan duren vooraleer de rode kleur van een litteken begint te vervagen. Direct zonlicht is in deze periode te vermijden.
 - Meestal krijgt u een begeleidende brief met een kort verslag mee voor uw huisarts, bezorg deze brief ten gepaste tijde (bij uw eerstvolgende bezoek of deponeer de brief in de brievenbus).
 - U kan bij verdere dringende vragen terecht bij de huisarts, apotheker of op onze spoedgevallendienst:
☎ 015 50 50 40