

Sticker / naam patiënt:

Soort onderzoek:

In te vullen door de aanvragende arts.

SOP DRINGENDE IV contrastallergievoorbereiding bij gehospitaliseerde patiënten/ patiënten op het dagziekenhuis:

Indicatie: Bij patiënten met gekende contrastallergie die dringend een onderzoek met IV contraststof moeten krijgen.

Indien enkel en ALLEEN contrastallergie gekend is en GEEN orale voeding mogelijk is:

Vorbereiding:

- **Intraveneus Solumedrol® 125 mg voor onderzoek in 100ml NaCl 0,9% over 20 min.**
- **20 min voor onderzoek: 1 amp Zantac® in 100 ml NaCl 0,9 % over 20 min (H2 blokker).**
- **60 min. voor onderzoek: Estivan® 20mg lyotab (H1 blokker).**
- **(Alternatief eventueel 1/2 amp Phenergan® im (niet iv):cave hypotensietoename).**

Opmerking: Indien er andere beïnvloedende factoren aanwezig zijn zoals nierinsufficiëntie en schildklierlijden, gelieve dan de contrastwizzard te raadplegen en dat resultaat af te drukken en te gebruiken als SOP voor de voorbereiding van de patiënt.

Naam behandelende arts + stempel + datum