



Apotheek Imeldaziekenhuis Bonheiden
Vragen? 015/50 62 03 of 015/50 62 00

Uw arts schrijft **antimycotica** voor die u thuis zal moeten innemen.

Ga indien nodig langs bij uw huisarts en uw huisapotheker. Neem steeds uw ontslagbrief en medicatieschema mee. Voorschriften kunnen door de zorgverlener opgezocht worden via uw identiteitskaart.



Waarom moet ik antimycotica innemen?

Om infecties met schimmels te bestrijden door ze te doden of hun groei te remmen. Antimycotica werken niet tegen virussen of bacteriën en niet voor elke infectie zijn antimycotica nodig. Bij griep of een verkoudheid heeft het bijvoorbeeld geen nut deze in te nemen. Antimycotica werken ook niet preventief. Neem ze dus enkel op advies van de arts.

Neem de antimycotica in via de **mond**. Het is een geneesmiddel in de vorm van een capsule, pil, siroop...

De frequentie, timing en duur van de behandeling bepalen het succes van de antimycoticakuur. **Volg de aanwijzingen van uw arts of apotheker nauwkeuring**. Verander ook nooit de dosis op eigen initiatief. Neem het antimycoticum steeds in op het voorgeschreven tijdstip.



Moet ik de hele doos antimycotica uitnemen?

Neem de antimycotica net zolang in als voorgeschreven, niet langer en niet korter. Soms kan dit betekenen dat je niet de hele doos moet uitnemen. Kijk op de ontslagbrief of het medicatieschema of vraag dit na bij uw arts of apotheker. Soms hangt dit ook af van hoe de ziekte verloopt en wordt dit op een tussentijdse controle verder bepaald. Stop nooit zomaar wanneer je je beter voelt, want dat kan bijdragen tot de ontwikkeling van resistentie. Dit wil zeggen dat antimycotica de infectie veel moeilijker of gewoon niet meer zullen genezen omdat schimmels ongevoelig worden voor de medicatie.



Wat doe ik met de overschot van de antimycotica?

Breng ze naar je apotheker. Gooi antimycotica nooit in de gootsteen, het toilet of de vuilnisbak. Anders komen ze in onze natuurlijke omgeving terecht en dat draagt bij tot de ontwikkeling van resistentie. Neem restjes nooit in op eigen initiatief, omdat de kans groot is dat het niet de juiste medicatie is. Dit kan een goede diagnose vertragen en je probleem verergeren.



Wat indien ik mijn antimycoticum niet op tijd ingenomen heb?

Neem het antimycoticum zo snel mogelijk alsnog in. Maar doe dit niet als het bijna tijd is voor de volgende inname. Neem de volgende dosering dan in op de normale tijd.



Apotheek Imeldaziekenhuis Bonheiden
Vragen? 015/50 62 03 of 015/50 62 00

Voriconazole

- Voriconazole wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige **schimmelinfecties**.
- Om ontwikkeling van resistentie (schimmels die ongevoelig worden voor deze medicatie) en ernstige ongewenste effecten te beperken, mag dit geneesmiddel enkel gebruikt worden bij specifieke infecties of omstandigheden. Uw arts kan dan een attest aanmaken voor terugbetaling van de medicatie. Neem dit geneesmiddel enkel op advies van uw arts en voor de periode voorgeschreven door uw arts.
- Het is enkel verkrijgbaar in de apotheek met een **voorschrift**.

Geneesmiddeleninteracties

- Bepaalde geneesmiddelen, voedingssupplementen (bv. Sint-Janskruid) of voeding (bv. pompelmoessap) kunnen de werking van voriconazole verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen.
- Vermeld steeds alle medicatie, voedings- en kruidensupplementen die u inneemt aan uw arts en apotheker.

Inname

- Volg **strikt** het voorschrift van de arts en neem de voorgeschreven hoeveelheid per keer en het aantal voorgeschreven innames per dag in.
- De inname is standaard tweemaal per dag met 12 uur tussentijd (steeds op dezelfde tijdstippen).
- Uw arts zal regelmatig de **voriconazolespiegel** in uw bloed controleren. De bloedafname gebeurt standaard 30 minuten voor u de medicatie inneemt. De dosis kan dan aangepast worden op basis van het gehalte van de medicatie in uw bloed.
- Neem uw geneesmiddel in op een lege maag: **één uur voor of één uur na de maaltijd**. Neem het geneesmiddel in met water.

Ongewenste effecten en voorzorgen

- **Vermijd rechtstreekse blootstelling aan zonlicht** (draag beschermende kledij en een hoofddekse) tijdens behandeling met voriconazole en stop de behandeling indien lichttoxiciteit (bv. huiduitslag) optreedt. Een zonnfilter of een zonnecrème met hoge beschermingsgraad dienen te worden overwogen.
- Het is mogelijk dat u na inname van dit geneesmiddel **gezichtsstoornissen**, zoals wazig zien of kleurveranderingen, ondervindt. Dit is niet gevaarlijk en de bijwerkingen verdwijnen meestal snel vanzelf. Verwittig uw arts, rij niet met een voertuig of gebruik geen gevaarlijke machines of apparaten indien u gezichtsstoornissen heeft.
- Tijdens de behandeling met dit geneesmiddel is het aanbevolen om regelmatig een **bloedonderzoek en controle van de lever en nieren** uit te voeren. Uw arts zal u hierover informeren.

Disclaimer Deze fiche is een samenvatting van de beschikbare informatie. Voor meer informatie, contacteer uw behandelende arts of apotheker. **Referenties:** (1) www.bcfi.be (2) Wetenschappelijke bijsluiter (3) www.riziv.be (terugbetalingscriteria). Versie 05-2023